

HIZLI BÜYÜYEN İZOLE DEV PERİNEAL LİPOM

RAPIDLY GROWING GIANT ISOLATED PERINEAL LIPOMA

Şafak Uygur , Tolga Eryılmaz.

Dr. İ. Şevki Atasagun Devlet Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Nevşehir.

Sayın Editör;

Lipomlar en sık görülen benign mezenşimal neoplazmlardan biridir. Lipomlar boyun, gövde, karın, ön kol ve kalçada sık; yüz, saçlı deri, sternumda nadir görülür.¹ Perineal bölge yerleşimli lipom son derece nadirdir ve çoğunlukla aksesuar skrotum veya labioskrotal kıvrım ile ilişkilendirilir. Lipomların çoğu küçük boyutlardadır ve nadiren 10 cm'nin üzerinde büyürler.

Bu çalışmada, perineal bölgede hızla büyüyen dev lipomu olan normal genital yapıya sahip bir olgu sunulmaktadır.

OLGU SUNUMU

Otuz üç yaşındaki erkek hasta perineal bölgesinde iki ay içerisinde hızla büyüyen kitle şikayeti ile başvurdu (Şekil 1). Hastada travma veya enfeksiyon öyküsü yoktu. Fizik muayenede perineal bölgede skrotumun sağ tarafında, hareketli, cilt altı yerleşimli, 15x10 cm boyutlarında kitle mevcuttu. Yapılan ultrasonografik görüntülemeye yağ içerikli solid kitle saptandı. Lokal anestezi altında lezyon üzerinden yapılan insizyonla yüzeysel, testiküler bölgeyle bağlantısı olmayan, 15x10x3 cm boyutlarındaki kitle eksize edildi (Şekil 2). Primer onarım yapıldı. Histopatolojik tanı lipom bulundu.

Çoğu lipom birkaç santimetre çaptadır. Dev lipomlar en az 10 santimetre çapa sahiptirler.² Dev lipomlar çoğunlukla gövde, servikal bölge ve uyluk bölgesinde bildirilmiştir.³

Perineal kitleler bazen tanı güçlüğü yaratabilir. Ayırıcı tanıda perineal herniler, kistler ve malign

tümörler yer alır. Hızla büyüyen dev kitle lezyonları maligniteyi düşündürmektedir. Bizim olgumuzda olduğu gibi dev tümörlerin atipik yerleşimi yanıltıcı olabilir. Liposarkomlar ile lipomların ayırıcı tanısı sadece klinik değerlendirme ile neredeyse imkansızdır. Bu nedenle bu tip lezyonların cerrahi eksizyonu liposakşına tercih edilmelidir.³ Perineal lipomlar çoğunlukla aksesuar skrotum veya labioskrotal kıvrım ile birlikte bildirilmişse de normal genital yapıya sahip bir olguda bu büyüklükte bir lipom literatürde oldukça nadirdir.^{4,5} Bu olgu lipomların perineal kitle ayırıcı tanısında akılda tutulması gerektiğini hatırlatmak amacıyla yayınlanmıştır.



Şekil 1. Hasta yatarken perineal kitlenin ameliyat öncesi görünümü



Şekil 2. Tümörün ameliyat sırasındaki görünümü (sol) 12x5x1,5 cm boyutundaki lipomun görünümü (sağ)

Dr. Şafak UYGUR
Ragıp Öner Mahallesi 101 Sk
93/1, 50000, Nevşehir
E-posta: safakuygur@gmail.com

KAYNAKLAR

1. Prantl L, Heine N, Ulrich D, Eisenmann-Klein M. An unusual localization of lipomas: an extremely rare case of two symmetrical perineal lipomas in an adult male patient: a case report. *Eur J Plast Surg* 2005;28(5):371-4.
2. Aydoğdu E, Yıldırım S, Eker G, Aköz T. Giant lipoma of the back. *Dermatol Surg* 2004;30:121-2
3. Terzioğlu A, Tuncali D, Yüksel A, Bingül F, Aslan G. Giant lipomas: a series of 12 consecutive cases and a giant liposarcoma of the thigh. *Dermatol Surg* 2004;30(3):463-7.
4. Musierowicz A, Matejczuk A. Giant perineal lipoma. *Pol Przegl Chir* 1977;49: 757-758.
5. Sistla SC, Reddy R, Sankar G, Elangovan S. Pelvic leiomyoma presenting as perineal hernia. *Hernia* 2009;13:213-5.