

MEME KÜÇÜLTME SONRASI GELİŞEN NADİR BİR KOMPLİKASYON: İNSİZYON HATTINDA EGZAMA A RARE COMPLICATION FOLLOWING BREAST REDUCTION: ECZEMA ON THE INCISION LINE

Burak Kaya, Mehmet Sönmez, Zeki Can

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Sayın Editör;

Meme küçültme plastik cerrahide en çok uygulanan ve hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameliyatlardan biridir. Meme küçültme ameliyatlarından sonra komplikasyon oranı %11 olarak bildirilmiş¹ olup en sık komplikasyonlar hematoma, enfeksiyon, cilt fleplerinde nekroz ve tekrar operasyon gereksinimidir. Nadir bir komplikasyon olarak operasyon bölgesinde cerrahi travma sonrası oluşan pyoderma gangrenosum vakası da bildirilmiştir.²

Elli iki yaşında kadın hasta kliniğimize bilateral makromamaya bağlı sırt ve omuz ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde makromamaya bağlı intertrigo, sağ ve sol nipple suprasternal çentik mesafeleri sırasıyla 33 cm ve 32 cm olarak saptandı. Hastaya bilateral Wise patern superomedial dermoglandüler pediküllü meme küçültme operasyonu yapıldı. Postoperatif dönemde 10. gün , 5. hafta ve 2. ay kontrollerinde komplikasyon saptanmadı. Ancak postoperatif dönemde 2. aydan itibaren sol nipple areola kompleksinin alt polünde, vertikal skarla birleşen bölgede kabuklanma ve sulanma şikayeti başladı. Günlük nemli pansumanlarla takip edilen hastanın postoperatif 2,5 ayda ve 3. ayda kabuklanan alanında genişleme saptandı . (Şekil 1) Bunun üzerine Dermatoloji bölümüne konsülte edildi. Bu bölümde hastanın egzama ile uyumlu görünümü saptanarak hastaya topikal steroidli tedavi başlandı. Takiplerinde egzamatize alanda küçülme saptanan hastada topikal tedaviye devam edildi ve takiplerinde lezyonların gerileyerek hafif bir pigmentasyon bırakarak iyileştiği gözlemlendi. (Şekil 2)

Meme küçültme ameliyatları sonrası oluşabilen erken dönem komplikasyonlar iyi bilinmekle birlikte, geç dönem komplikasyonlar halen çok açık değildir. Olgu-



Şekil 1. Postoperatif 2,5 ay görünümü



Şekil 2. Postoperatif 2,5 ay görünümü, yakın plan



Şekil 3. Topikal steroid tedavisi sonrası görünüm

muzda da olabileceği gibi ³ insizyon hattı çevresinde giysilerde bulunan tekstil boyalarının kontakt dermatit oluşturup egzama görünümüne yol açabileceği bildirilmiştir. Yine sütür materyallerine karşı da bu şekilde bir reaksiyon gözlenebilmektedir. Diğer yandan olgumuzun tek taraflı olması burada negatif bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Olası nedenler dışlandığında gözlenen idiyopatik dermatit de bildirilmiştir. ⁴

Sonuç olarak, bu olguda gözleendiği gibi, meme küçültme ameliyatları sonrasında da cerrahi travma sahasında geç dönemde egzamatize görünüm bir komplikasyon olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda olası nedenlerin dikkatle sorgulanması, mümkünse bulunan etkenin uzaklaştırılması ve neden bulunamıyorsa da topikal tedavi ile bu alanın kontrol altına alınarak semptomların yatıştırılması gerekmektedir.

Dr. Mehmet Sönmez

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

E-posta: msonmez@ankara.edu.tr

KAYNAKLAR

1. Yoon S. Chun, M.D.Xiangmei Gu, M.S, Stuart R. Lipsitz, Sc.D, Matthew J. Carty, M.D. Body Mass Index as a Predictor of Postoperative Complications in Reduction Mammoplasty. Plastic and Reconstructive Surgery J, Vol: 129 N:2, 229-33.
2. C. Grau Salvat, F.J. Miquel, V. Pont, A. Aliaga. Pyoderma gangrenosum: unusual complication following mammoplasty reduction. International Journal of Dermatology Volume 37, Issue 10, pages 794-6.
3. Caliskaner Z, Kartal O, Baysan A, Yesillik S, Demirel F, Gulec M, Sener O. A case of textile dermatitis due to disperse blue on the surgical wound. Hum Exp Toxicol. 2012 Jan;31(1):101-3.
4. Bewsher SM, Kurzydlo AM, Gillespie RJ. Idiopathic post-traumatic dermatitis at the site of recent joint replacement. Contact Dermatitis. 2008 Jan;58(1):54-5.